

Anlage 1

Tabelle 1: Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Impfung	Alter in Wochen				Alter in Monaten				Alter in Jahren				
	6	2	3	4	4	11-14	15-23	2-4	5-6	9-14	15-17	ab 18	ab 60
Tetanus		G1	G2	G3	G3	G4	N	N	A1	A2	A2	A (ggf. N) ^e	
Diphtherie		G1	G2	G3	G3	G4	N	N	A1	A2	A2	A (ggf. N) ^e	
Pertussis		G1	G2	G3	G3	G4	N	N	A1	A2	A2	A (ggf. N) ^e	
Hib <i>H. influenzae</i> Typ b		G1	G2 ^c	G3	G3	G4	N	N					
Poliomyelitis		G1	G2 ^c	G3	G3	G4	N	N	N	A1		ggf. N	
Hepatitis B		G1	G2 ^c	G3	G3	G4	N	N	N				
Pneumokokken ^a		G1	G2	G2	G2	G3	N						S ^g
Rotaviren	G1 ^b	G2			(G3)								
Meningokokken C					G1 (ab 12 Monaten)				N				
Masern					G1	G2			N				S ^f
Mumps, Röteln					G1	G2			N				
Varizellen					G1	G2			N				
Influenza													S (jährlich)
HPV Humane Papillomviren										G1 ^d	G2 ^d	N ^d	

Erläuterungen

G Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1-G4)

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

N Nachholimpfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

a Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d.h. insgesamt 4 Dosen

b Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.

c Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.

d Standardimpfung für Mädchen im Alter von 9-13 bzw. 9-14 Jahren (je nach verwendetem Impfstoff) mit 2 Dosen im Abstand von 6 Monaten, bei Nachholimpfung im Alter > 13 bzw. > 14 Jahren oder bei einem Impfstand von < 6 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).

e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

f Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit, mit einem MMR-Impfstoff

g Einmalige Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff